

Géométrie différentielle - Courbes en dimension 2 et 3

Exercice 1 On considère trois points A, B, C non alignés dans le plan, et une droite (d) coupant respectivement les droites (BC) , (AC) et (AB) en A', B' et C' . Par le point A' , on mène les parallèles à (AB) et (AC) qui coupent respectivement en D et E la parallèle à (BC) passant par A . On souhaite prouver que les droites $(B'D)$ et $(C'E)$ sont parallèles, et on se place pour cela dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

1. Faire une figure.
2. Que peut-on dire des coordonnées de B' et de C' dans le repère choisi ?
3. Déterminer en fonction de ces coordonnées une équation de (d) , de (BC) , puis les coordonnées des points A', D et E .
4. Conclure à l'aide d'un calcul de déterminant.

Exercice 2 Soit \mathcal{C} le cercle d'équation cartésienne $x^2 + y^2 - 6x + 2y + 5 = 0$, et $A : (4, -4)$. On peut mener par le point A deux tangents au cercle \mathcal{C} . Calculer la distance entre les points d'intersection de ces tangentes avec \mathcal{C} .

Exercice 3 Traiter les points indiqués en marron dans le cours (au moins quelques points ...).

Exercice 4 Etudier et tracer la courbe paramétrée définie sur \mathbb{R} par $\gamma(t) = \left(t^2, \frac{(1+t)^2}{1+t^2} \right)$.

Exercice 5 Soit Γ la courbe d'équation paramétrique $x = 3t^2, y = 2t^3, t \in \mathbb{R}$.

1. Étudier et tracer Γ .
2. Déterminer les droites à la fois tangentes et normales à Γ .

Exercice 6 Soit a et b 2 réels non nuls. Soit $\Gamma_{a,b}$ le support de la courbe de représentation paramétrique $\gamma_{a,b}(t) = \left(2t + \frac{a^3}{t^3}, t^2 + \frac{b^3}{t} \right)$, définie sur $]0, +\infty[$.

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\Gamma_{a,b}$ possède un et un seul point de rebroussement.
2. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que $\Gamma_{a,b}$ possède au moins un point double.

Exercice 7

1. Soit $p > 0, e \geq 0$ et soit la courbe définie par l'équation polaire $r(\theta) = \frac{p}{1 + e \cos \theta}$. Décrire la courbe suivant les valeurs de e (on pourra passer aux coordonnées cartésiennes et trouver une équation définissant la courbe).
2. Pour $c > 0$ et $\alpha \in [0, \pi[$, on considère la courbe définie par l'équation polaire $r(\theta) = \frac{c}{\sin(\theta - \alpha)}$. Décrire la courbe et donner un sens géométrique aux paramètres c et α .
3. Pour $d > 0$ et $\alpha \in [0, 2\pi]$, on considère la courbe définie par l'équation polaire $r(\theta) = d \cos(\theta - \alpha)$. Déterminer la courbe et donner un sens géométrique au paramètre d .

Exercice 8 Etudier et tracer les courbes d'équation polaire :

1. $r(\theta) = \cos(\theta)/\sin(\theta)$,
2. $r = 1 - 2\sin(\theta)$.

Exercice 9 Soit $\gamma : t \in I \mapsto (x(t), 0, z(t))$ une courbe tracée dans un plan vertical. Paramétrer la surface de révolution engendrée par la rotation de cette courbe autour de l'axe Oz .

Exercice 10 Soit $\gamma : t \in]0, +\infty[\mapsto \left(t, t + \frac{1}{t}, t + \frac{1}{2t^2}\right)$. Donner une équation du plan osculateur au support de γ en $\gamma(1)$.

Exercice 11 Soit Γ l'astroïde d'équation paramétrique $x(t) = \cos^3 t$, $y(t) = \sin^3 t$, $t \in \mathbb{R}$. Étudier et tracer Γ .

Exercice 12 Soit Γ la courbe d'équation paramétrique : $x(t) = 3 - 2\cos(t) - \cos(2t)$, $y(t) = 2\sin(t) - \sin(2t)$, $t \in \mathbb{R}$.

1. Réduire le domaine d'étude (en précisant les transformations).
On note Γ_1 la partie de la courbe correspondant à $t \in [0, \pi]$.
2. Montrer que la courbe Γ_1 présente deux points singuliers, pour $t = 0$ et $t = t_0$ que l'on déterminera.
On note I le point de paramètre t_0 .
Donner l'allure de la courbe au voisinage des points O et I (équation des tangentes, position relative de la courbe et des tangentes).
On note T la tangente à Γ au point I .
3. Soient \mathcal{C}_1 et \mathcal{C}_2 les cercles de centre $\Omega : (3, 0)$ et de rayons respectifs $R_1 = 3$ et $R_2 = 1$.
 - 3.a. Vérifier que la droite T passe par Ω . Déterminer $\Gamma \cap \mathcal{C}_1$.
 - 3.b. Soit J le point de Γ de paramètre $\pi/3$. Montrer que γ est tangente à \mathcal{C}_2 au point J .
4. Tracer les courbes Γ , \mathcal{C}_1 , \mathcal{C}_2 et T .
5. Montrer que la courbe Γ est invariante par la rotation de centre Ω et d'angle $2\pi/3$. (On pourra utiliser des affixes complexes.)
6. Calculer la longueur de Γ .
7. Calculer le repère de Frénet en chaque point, et le centre de courbure.

Exercice 13 Déterminer la longueur de la courbe, le repère de Frénet en chaque point, et le centre de courbure de la courbe d'équation paramétrique :

$$\begin{cases} x(t) &= \frac{1-t^2}{(1+t^2)^2} \\ y(t) &= \frac{2t}{(1+t^2)^2} \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

Exercice 14 Calculer la longueur et la courbure de chacune des courbes polaires suivantes (on pourra évidemment donner une allure de chacune de ces courbes) :

1. $r = 3\theta$, $\theta \in \mathbb{R}$,

2. $r = \cos^3(\theta/3)$, $\theta \in \mathbb{R}$.

Exercice 15 On considère l'hyperbole équilatère \mathcal{H} d'équation $xy = 1$ et un point M de l'hyperbole. La normale à \mathcal{H} au point M recoupe \mathcal{H} en un second point N . Montrer, en notant I le centre de courbure au point M , que : $\overrightarrow{NM} = 2\overrightarrow{MI}$.

Exercice 16 La courbe développée d'un arc paramétré est la courbe obtenue en prenant le lieu de ses centres de courbure.

I. On considère la cardioïde d'équation polaire $\rho = 1 + \cos(\theta)$.

1. Montrer que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, le rayon de courbure vaut : $R = \frac{4}{3} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$.
2. Montrer que le centre de courbure I a pour coordonnées dans le repère $(O, \vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta)$:

$$I : \left(1 + \cos(\theta) - \frac{2}{3}(1 + \cos(\theta)), -\frac{2}{3} \sin(\theta) \right).$$

3. Montrer que si $A : (2/3, 0)$, les coordonnées de I dans le repère (A, \vec{i}, \vec{j}) sont :

$$I : \frac{1}{3} ((1 - \cos(\theta)) \cos(\theta), (1 - \cos(\theta)) \sin(\theta))$$

et en déduire que la développée de la cardioïde est une cardioïde.

II. Montrer de même que la développée de l'ellipse d'équation cartésienne $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ est une astroïde (on pourra montrer que $I : (-3 \cos^3(t), \frac{3}{2} \sin^3(t))$).

Exercice 17 Soit l'hélice paramétrée par la longueur d'arc :

$$\gamma(s) = \left(a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + b^2}}, a \cos s \sqrt{a^2 + b^2}, \frac{bs}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right),$$

où a et b sont des paramètres réels.

1. Vérifier que les droites tangentes à cette hélice font toutes un angle constant avec l'axe Oz du cylindre.
2. Calculer la courbure et la torsion de γ (elles devraient être constantes).