

GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE. — *Fonctions holomorphes bornées ou à croissance polynomiale sur la courbe $e^x + e^y = 1$.* Note (*) de **Jean-Pierre Demailly**, transmise par Paul Malliavin.

Nous démontrons un théorème d'extension très précis pour les fonctions holomorphes de deux variables complexes sur la courbe $e^x + e^y = 1$, et en déduisons que les fonctions holomorphes bornées sont constantes, ou plus généralement, que toute fonction à croissance polynomiale s'étend en un polynôme sur \mathbf{C}^2 . Outre l'application immédiate aux fonctions méromorphes, ce résultat permet d'étudier certaines hypersurfaces de \mathbf{C}^n .

We show a very precise extension theorem for holomorphic functions on the curve $e^x + e^y = 1$, and deduce from it that bounded holomorphic functions are constant, or more generally, that every holomorphic function with polynomial growth extends to a polynomial in \mathbf{C}^2 . This result immediately applies to meromorphic functions, and can also be used to study some hypersurfaces of \mathbf{C}^n .

1. EXTENSION DES FONCTIONS HOLOMORPHES. — Nous noterons S la courbe d'équation $e^x + e^y = 1$ dans \mathbf{C}^2 .

THÉORÈME 1. — *Soient φ une fonction plurisousharmonique dans \mathbf{C}^2 vérifiant la condition de Lipschitz $|\varphi(z) - \varphi(z')| \leq A$ pour tous points z, z' tels que $|z - z'| \leq 1$, et f une fonction holomorphe sur la courbe S telle que $|f(z)| \leq e^{\varphi(z)}$ pour z appartenant à S . Alors il existe une fonction entière F prolongeant f telle que*

$$|F(z)| \leq 10^4 e^{3A} (1 + |z|)^5 (1 + |e^x + e^y|) e^{\varphi(z)},$$

avec les notations $z = (x, y) \in \mathbf{C}^2$, $|z|^2 = |x|^2 + |y|^2$.

La démonstration, très technique, est néanmoins classique dans son principe, et fait appel aux estimations d'Hörmander (2). Nous renvoyons le lecteur à (1) pour le détail.

2. FONCTIONS A CROISSANCE POLYNOMIALE SUR S . — Le principal résultat, déjà démontré par I. Wakabayashi (4) pour les fonctions bornées (par une méthode différente), est le suivant :

THÉORÈME 2. — *Soit f une fonction holomorphe sur S telle que $|f(z)| \leq C(1 + |z|)^n$ pour $z \in S$, où C est une constante positive, et n un réel. Alors f est la restriction à S d'un polynôme sur \mathbf{C}^2 de degré au plus égal à n .*

Nous démontrons le théorème 2 en considérant l'extension F de f fournie par le théorème 1. L'argument essentiel consiste à remarquer que F est polynomiale sur chacune des droites $y = x + (2k + 1)i\pi$, $k \in \mathbf{Z}$, de la courbe $e^x + e^y = 0$, et permet d'obtenir le :

LEMME. — (i) *Soit F une fonction entière sur \mathbf{C}^2 telle que $|F(z)| \leq C(1 + |z|)^n (1 + |e^x + e^y|)$ pour tout z dans \mathbf{C}^2 . Alors il existe des polynômes G et H de degré au plus égal à n tels que*

$$F(z) = G(z) + (e^x + e^y)H(z).$$

(ii) *Soit P un polynôme sur \mathbf{C}^2 tel que $|P(z)| \leq C(1 + |z|)^n$ sur S . Alors le degré de P ne dépasse pas n .*

Il en résulte très facilement les corollaires suivants :

COROLLAIRE 1 (analogue pour S du théorème de Picard). — *Une fonction méromorphe non constante sur S prend toute valeur une infinité de fois, sauf éventuellement un ensemble maigre de valeurs.*

COROLLAIRE 2. — Soit f une fonction méromorphe non nulle (resp. et d'ordre fini) dans \mathbf{C}^n . Alors toute fonction holomorphe bornée (resp. à croissance polynomiale par rapport à x, y, w) sur l'hypersurface de \mathbf{C}^{n+2} d'équation $e^x + e^y = f(w)$, est constante (resp. polynomiale).

Le corollaire 2 résout un cas particulier d'une conjecture de L. A. Rubel, W. A. Squires et B. A. Taylor :

CONJECTURE. — Si $f_1, \dots, f_n, n \geq 3$, sont des fonctions méromorphes non constantes dans le plan, toute fonction holomorphe bornée sur l'hypersurface $f_1(z_1) + \dots + f_n(z_n) = 0$ [irréductible d'après (3)] est constante.

3. APPLICATIONS. — Soient $\Sigma_n (n \geq 1)$ l'hypersurface de \mathbf{C}^{n+1} d'équation $e^{z_1} + \dots + e^{z_{n+1}} = 1$, égale à S pour $n=1$, et p_n l'application de Σ_n dans \mathbf{C}^n qui au point (z_1, \dots, z_{n+1}) fait correspondre $(e^{z_1}, \dots, e^{z_n})$.

p_n est un revêtement d'espace total Σ_n , et de base l'espace $X_n = \mathbf{P}^n$ privé des $(n+2)$ hyperplans $w_1=0, \dots, w_n=0, w_1 + \dots + w_n - 1 = 0$, et de l'hyperplan à l'infini (en coordonnées non homogènes w_1, \dots, w_n). Le groupe des automorphismes du revêtement est le groupe, isomorphe à \mathbf{Z}^{n+1} , des transformations $(z_j)_{1 \leq j \leq n+1} \mapsto (z_j + 2ik_j\pi)_{1 \leq j \leq n+1}$ où les k_j sont des entiers. Comme $X_1 = \mathbf{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ admet pour groupe fondamental un groupe libre à deux générateurs, et que le groupe d'automorphismes du revêtement $\Sigma_1 \rightarrow X_1$ est isomorphe à \mathbf{Z}^2 , $\Sigma_1 = S$ est le revêtement homologique de X_1 (i.e. le plus « grand » revêtement abélien de X_1). Pour $n \geq 2$, Σ_n s'identifie au revêtement universel de X_n (ce qui signifie encore que Σ_n est simplement connexe).

Le corollaire 2 nous permet donc de retrouver le résultat suivant de I. Wakabayashi (4) :

COROLLAIRE 3. — Pour $n \geq 2$, toute fonction holomorphe bornée sur le revêtement universel de l'espace projectif \mathbf{P}^n privé de $(n+2)$ hyperplans en position générale est constante.

(*) Séance du 11 décembre 1978.

(1) J.-P. DEMAILLY, *Fonctions holomorphes à croissance polynomiale sur la surface d'équation $e^x + e^y = 1$* [Bull. Sc. Math. (à paraître)].

(2) L. HÖRMANDER, *An Introduction to Complex Analysis in Several Variables*, North-Holland Publishing Company, 1973.

(3) L. A. RUBEL, W. A. SQUIRES et B. A. TAYLOR, *Irreducibility of Certain Entire Functions with Applications to Harmonic Analysis* (preprint).

(4) I. WAKABAYASHI, *Comptes rendus*, 285, série A, 1977, p. 373.